

HUVUDVÄRKSDAGBOK

En huvudvärksdagbok kan vara ett sätt att hitta samband och se vilka faktorer som gör att man får huvudvärk. Den kan också vara bra att ta med sig vid ett läkarbesök.

Kontakta vårdcentral eller sjukvårdsupplysning om:

- huvudvärken sitter i mer än en vecka
- du är äldre, drabbas av huvudvärk utan att ha haft det tidigare
- intensiv huvudvärk som kommer plötsligt
- huvudvärken stör det vardagliga livet
- du äter värktabletter fler gånger i veckan
- huvudvärken kommer efter att du har fått ett slag mot huvudet
- du samtidigt tappat känslan från en kroppsdel
- du får tal- eller synrubbnings
- du får kraftig huvudvärk och blir slö eller svimmar av

Datum		Klockslag		Huvudvärk			Medicin	Effekt medicin			Skriv vad som utlöste huvudvärken	Egna anteckningar
ÅÅ-MM-DD	Start	Slut	Mild*	Måttlig**	Svår***	Skriv om du använt ngt läkemedel	Bra	Mindre bra	Inte bra	Till exempel mat, dryck, ljussken, ljud, menstruation, stress, sömnbrist, avslappning efter stress eller vid fysisk ansträngning		
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			
			○	○	○		○	○	○			

* **Mild huvudvärk:** Påverkar inte arbete eller aktiviteter. ** **Måttlig huvudvärk:** Påverkar, men förhindrar inte arbete eller aktiviteter. *** **Svår huvudvärk:** Hindrar arbete eller aktiviteter.



TREO brustablett (acetylsalicylsyra 500 mg/koffein 50 mg) är ett receptfritt läkemedel mot huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber. Treo ska inte användas av barn under 14 år, eller ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Intag av Treo ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Läs bipacksedeln noga före användning. Marknadsförs av Meda AB, A Mylan Company www.medasverige.se